

חדשות חיפה והצפון 17.2.2016

חדשות חיפה והצפון

העיקר בריאות

נדבק ברואנדה בשני סוגים של מלריה וטופל בבי"ח בני ציון

צעיר בן 30 שעבד באפריקה תקופה ממושכת לא נטל תרופות מונעות למלריה וחלה בשני סוגים שונים של הטפיל



מנהל היחידה למחלות זיהומיות ומרפאת המטיליים בבי"ח בני ציון, פרופ' ישראל פוטסמן. (צילום: אפרת לכתור)

מנהל מרפאת המטיליים והיחידה למחלות זיהומיות בבי"ח בני ציון מדגיש ואומר כי "כדי להימנע מחיידקים במלריה על כל מטייל לגשת למרפאת מטיילי קרובה ולהצטייד בכדורים מונעי מלריה אשר יינתנו להם בהתאם לאזור בו הם מתכוונים לשהות. הכדורים הקיימים כיום מקנים הגנה כשיעור של מעל 95%. בנוסף, יש להימנע מתכשירים דוחי יתוש בנסף ללבישת בגדים ארוכים ונעלי גבוהות והקפדה על שינה עם חלונות מרושתים וזבילות".

צעיר ישראלי, בן 30, שעבד ברואנדה, אפריקה, ארשתו בבי"ח בני ציון לאחר שאובחן כמי שנדבק במלריה ולאחר מספר ימים שוחרר במעב תקין מבי"ח.

לרבי מנהל היחידה למחלות זיהומיות ומרפאת המטיליים בבי"ח בני ציון, פרופ' ישראל פוטסמן, "מדובר בצעיר שלא נטל תרופות מונעות למלריה וחלה בשני סוגים שונים של הטפיל. למן, מוטלן מאוד לקבל טיפול תרופתי מונע באופן קבוע בזמן השתייה באזורי מלריה".

פרופ' פוטסמן, ציין כי הצעיר שעבד באפריקה תקופה ממושכת הגיע לחדר המיון בבי"ח בני ציון עם חום וצמרמורת, לאחר שטופל כבר בסוג אחד של מלריה עוד באפריקה. סביר להניח שהצעיר נדבק כנראה בו זמנית, גם בסוג הקשה יותר וגם בסוג הקל יותר אותו "יובא" ארצה.

"קיימים המישה סוגים שונים של מלריה המועברים בולם על ידי עקיצת יתושים". מסביר פרופ' פוטסמן, "עדן אין חיסון למחלה ולכן הייבום לקחת טיפול מונע על ידי כדורים בכל משך השעות באזור נגוע ואף לאחר היציאה. על המת-כננים לצאת לטיולים או עבודה באפריקה, שם הסיכוי להיידבק במלריה הינו פי חמש מאשר במזרח הרחוק. לקחת כחשבון מחלה קשה זאת. מחלת המלריה מהווה סכנה אמיתית ומוחשית באפריקה ונחשבת לאחר מגרמי התמותה העיקריים שם".